


VULVOSKOOPIA

PATSIENDI INFOLEHT



UURINGU EESMÄRK

Vulvoskoopia käigus uuritakse nahamuutusi välissuguelunditel suurendust võimaldava optilise aparaadi abil. Enamasti teostatakse samaaegselt ka kolposkoopia, mis on tupe ja emakakaela uuring.

ETTEVALMISTUS UURINGUKS

Võimalusel ei teostata vulvoskoopiat menstruatsiooni ajal ja verejooksu korral tupest.

Enne uuringule tulekut ei ole soovitatav määrida välissuguelunditele rasvaseid või õliseid aineid alates uuringule eelneva päeva õhtust.

Vulvoskoopiale tulles tuleb kaasa võtta suunava arsti poolt väljastatud saatekiri ja teostatud uuringute vastused, juhul kui Teie arst pole öelnud teisiti (st andmed ei ole saadetud digilukku).

Palume Teil enne uuringut informeerida arsti oma teadaolevatest haigustest, kasutatavatest ravimitest ja ülitundlikkusest ravimitele.

UURINGU KÄIK

Vulvoskoopia teostatakse günekoloogilises toolis. Nahamuutuste nähtavale toomiseks kasutatakse äädikhappelahust, mis võib tekitada ärritustunnet.

Vajadusel võtab uuringut teostav arst välissuguelundite nahast väikese koeproovi ehk biopsia läbimõõduga umbes 4 mm, mis saadetakse histoloogilisele uuringule. Enne koeproovi võtmist manustatakse Teile lokaalselt süstitavat valuvaigistit.

Uuring kestab orienteeruvalt 20-25 minutit ja võib põhjustada ebamugavustunnet, süstitava valuvaigisti manustamine on valulik.

PÄRAST UURINGUT

Pärast vulvoskoopia teostamist võite jätkata igapäevatoimingutega.

Kui uuringu käigus on võetud koeproov, siis enamasti suletakse tekkinud haav õmblusega.

Valdavalt kasutatakse iseimenduvat õmblusmaterjali (st õmblused ei vaja eemaldamist). Uuringut teostav arst informeerib Teid, kui on kasutatud mitteimenduvat õmblusmaterjali, ja annab soovitused õmblusniitide eemaldamiseks.

Koeproovi võtmise järgselt võib esimestel päevadel esineda valulikkust haava piirkonnas ja vähest veritsust haavast. Vajadusel võite tarvitada valuvaigisteid, näiteks ibuprofeeni 400-600 mg 6 tunni tagant.

Haava paranemiseni ei ole soovitatav elada suguelu, istuda vannis ja ujuda, haava paranemine võib võtta aega kuni üks kuu.

Võetud koeproovi vastus saabub kahe nädala jooksul.

VÕIMALIKUD TÜSISTUSED

Tüsistusi esineb vulvoskoopia puhul harva. Väga harva võib tekkida allergiline reaktsioon (kui uuringul on kasutatud valuvaigistit).

Kui uuringu käigus on võetud koeproov, võivad tüsistusteks olla põletik ja verejooks. Tugeva valu, punetuse ja turse tekkimisel haava piirkonda või rohke veritsuse korral haavast on soovitatav pöörduda erakorraliselt naistearsti vastuvõtule.

